



نشان بیمارستان

ارزیابی خطر آمبولی وریدی در بارداری و پس از زایمان

RISK ASSESSMENT FOR VENOUS THROMBOEMBOLISM (VTE)

شماره پرونده: Unit No:

Attending Physician: پزشک معالج:	Ward: بخش:	Name: نام:	Family Name: نام خانوادگی:
Date Of Admission: تاریخ پذیرش:	Room: اتاق:	Date Of Birth: تاریخ تولد:	Father Name: نام پدر:
	Bed: تخت:		

عوامل خطر مربوط به سابقه ترومبوآمبولی وریدی (VTE) یا ابتلا به ترومبوفیلی:

Previous venous thromboembolism (VTE): سابقه ترومبوآمبولی وریدی:
Heritable thrombophilia: ابتلا به ترومبوفیلی ارثی:
Acquired thrombophilia (Antiphospholipid antibody): ابتلا به ترومبوفیلی اکتسابی (آنتی فسفولیپید آنتی بادی):

سایر عوامل خطر:

شرایط عمومی و بارداری فعلی:

اعتیاد تزریقی	استعمال دخانیات بیش از ۱۰ نخ سیگار در روز	سن بیشتر از ۳۵ سال
Intravenous drug user	Smoking > 10 Cigarettes / day	Age > 35 years
وریدهای واریسی	Paraplegia / Wheelchair user	فلج / استفاده از صندلی چرخدار
Gross Varicose Veins		
چاقی (BMI بیشتر از ۳۰) قبل یا اوایل بارداری / وزن بیشتر از ۸۰ کیلوگرم		
Obesity (BMI) > 30 Kg/m ² either pre pregnancy or early pregnancy / weight > 80 Kg		
بستری در بیمارستان، ICU یا بی حرکتی (مساوی یا بیشتر از ۳روز استراحت در بستر)		
Admission or Immobility (≥ 3 days)		
OHSS	چندقلویی	زایمان سوم یا بیشتر
سندرم هیپراستیمولیشن تخمدان	Multiple pregnancy	Parity≥3
ART	استفراغ شدید بارداری	دهیدراتاسیون
بارداری با روش های کمک باروری	Hyperemesis gravidarum	Dehydration

ابتلا به بیماری ها:

Pneumonia	پنومونی	Lung disease	بیماری ریوی	Heart disease	بیماری قلبی
SLE	لوپوس	Cancer	سرطان	Pyelonephritis	پیلونفریت
Current systemic infection				Sickle cell disease	بیماری سایکل سل

Nephrotic syndrome (proteinuria > 3 g / day) سندروم نفروتیک (پروتئینوری بیشتر از ۳ گرم در روز)

Inflammatory conditions (Inflammatory bowel disease or inflammatory polyarthropahty) التهاب ها (بیماری های التهابی روده، پلی آرتروپاتی التهابی)

شرایط مربوط به دردهای زایمان، زایمان و پس از زایمان:

Pre-eclampsia پره اکلامپسی	Cesarean سزارین (اورژانس یا غیراورژانس)	Prolonged labor (>24 hours) لیبر طولانی (بیشتر از ۲۴ ساعت)
Postpartum infection عفونت پس از زایمان	Mid-cavity rotational operative delivery زایمان با فورسیس بالا	Blood transfusion تزریق خون
Postpartum sterilization بستن لوله ها (پس از زایمان طبیعی)	Evacuation of retained products of conception کورتاژ	Postpartum hemorrhage (>1 litre) خونریزی پس از زایمان بیش از یک لیتر

Any surgical procedure in pregnancy or < 6weeks postpartum هر نوع عمل جراحی در بارداری یا پس از زایمان (تا ۶ هفته)

Result assessment: نتیجه بررسی:

تاریخ و ساعت تکمیل فرم:

Date & time

نام و نام خانوادگی و امضاء پزشک معالج:

Name & Signature